

## **Cereza cepillo**



*Syzygium australe* (= *Eugenia australe*; = *Eugenia myrtifolia*), comúnmente llamado cereza cepillo (Brush Cherry), es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia de las mirtáceas.

Es un árbol de los bosques templados húmedos que es nativo del este de Australia. Puede lograr una altura de 35 m con un diámetro de 6 dm. Las hojas son opuestas, simples, lanceoladas de 4-8 cm de largo. Las flores son blancas y en racimos. Las frutas de color rojo oscuro son comestibles. La cereza cepillo es comúnmente cultivado en el este de Australia, mayormente en sus cultivares más pequeños y arbustivos. Esos son especialmente populares como setos. Las agradables frutas ácidas se comen también frescas o cocinadas. La fruta puede ser usada para elaborar mermeladas y jaleas. Comúnmente confundida con *Syzygium paniculatum*, lilly pilly magenta.

Es una planta bastante resistente que puede soportar el frío fácilmente; en los períodos más fríos del año, de hecho, no tenemos que preocuparnos por las temperaturas mínimas; Puede soportar una temperatura de unos pocos grados bajo cero: puede soportar hasta -5°C, siempre que esté en un lugar soleado y protegido de los vientos fríos. Alternativamente, puede cultivarse en macetas grandes y mantenerse en interiores.

Le gustan los lugares luminosos, pero no debe exponerse a los rayos directos: solo necesita unas pocas horas de sol al día.

Prefiere un sustrato fértil, ligero y bien drenado. Se fertiliza en otoño y primavera con un producto orgánico o de liberación lenta y se debe regar bien durante los períodos cálidos, teniendo cuidado de no dejar que el agua se estanque en las raíces.

Para un desarrollo floreciente, es importante recordar fertilizar periódicamente nuestros arbustos; En la primavera, usamos un fertilizante rico en nitrógeno y potasio, que favorecerá el desarrollo de nuevas hojas y nuevas flores. Podemos intervenir al final del invierno mezclando el suelo alrededor de la planta con una buena dosis de fertilizante orgánico o fertilizante químico de liberación lenta. En primavera, se recomienda intervenir periódicamente, con fertilizantes líquidos o en polvo, para agregar al agua para el riego, cada 20-25 días.

Recuerde que para estimular el desarrollo de nuevo follaje, es aconsejable acortar ligeramente todas las ramas de la planta, a fin de eliminar las hojas secas y promover el desarrollo de brotes.

**Categoría:** Plantas de follaje al aire libre

**Familia:** Myrtaceae

**Género:** Eugenia

**Especie:** myrtifolia "New Port"

**Zona Geográfica de Origen:** Oceanía

**Zonas Climáticas:** Mediterraneo: Sud ed Isole, Colina USDA 10 a

**Porte:** Arbusto

**Hojas:** Siempreviva

**Colore Foglie:** Verde  Arancione 

**Periodo de Floración:** Luglio / Agosto / Settembre

**Flor:** Panícula

**Colore Fiori:** Giallo 

**Suolo:** Medianamente acido / Neutro / Media suolo

**Necesidades Hídricas:** Media acqua

**Exposición a la Luz:** Media Sombra / Sol



[www.milazzooflora.it](http://www.milazzooflora.it)

**Forma:** Piramide / Arbusto / Columna

**Colore Frutti:** Rosso 