


## Kentia



La **Kentia** (*Howea forsteriana*) est une espèce de la famille des *Arecaceae* (Palmier). L'espèce est dédiée à Henry William Forster, sénateur de la Nouvelle-Galles du Sud. Initialement, le ***Howea forsteriana*** (C. Moore ex H. Wendl.) Becc. (1877) a été inclus dans le genre ***Kentia***, mais, en 1877, le grand botaniste florentin, Odoardo Beccari, l'a placé dans un nouveau genre, qu'il a nommé ***Howea***.

Malgré cela, le premier nom original est celui sous lequel il est encore communément connu.

Dans les pays anglophones, il est également appelé "Sentry Palm" ou "Thatch Palm".

Ce palmier est originaire de l'île Lord Howe, située à 600 km de la côte orientale de l'Australie, riche en plantes endémiques, parmi lesquelles les quatre palmiers qui y poussent sont : le ***Howea forsteriana***, le ***Howea belmoreana***, le ***Hedyscepe canterburyana*** et le ***Lepidorrhachis mooreana***.

Le ***Howea forsteriana*** est l'élément prédominant de la forêt sub-tropicale de l'île, jusqu'à environ 400 mètres d'altitude.

Il présente un stipe solitaire, mince, d'environ 15 cm de diamètre, légèrement élargi à la base, haut de 15 mètres et même plus, de couleur vert foncé (gris dans la partie la plus ancienne), où sont visibles les anneaux laissés par les jonctions des vieilles feuilles.

Les feuilles, pennées et élégamment courbées, mesurent environ 3 mètres de long, avec des folioles pendants vert foncé, atteignant 70 cm de longueur. C'est une espèce monoïque avec une inflorescence formée de 3-7 épis, longues d'environ un mètre qui se ramifient à partir d'un pédoncule large et court où se trouvent les fleurs des deux sexes.

Les fruits sont ellipsoïdes, de 3-4 cm de long, rouge foncé à maturité, la maturation se déroulant lentement (3-4 ans), la même plante peut donc présenter simultanément inflorescences et infrutescences, avec des fruits à différents stades de maturation (vert, jaune et rouge foncé).

Les graines de ***Howea forsteriana*** germent en 80 jours environ avec chaleur de fond.

Cette plante a une grande valeur ornementale, elle peut être cultivée en plein air, dans des zones subtropicales et tempérées chaudes, pour la décoration de parcs et jardins, dans un endroit partiellement ombragé à l'état jeune, et régulièrement arrosée.

Mais l'utilisation la plus fréquente, depuis son introduction en Europe, est comme plante d'intérieur. Son

élégance, dès les premières années, l'adaptabilité à des conditions de faible luminosité et l'absence d'attentions particulières la rendent encore aujourd'hui l'un des palmiers les plus utilisés, sinon le plus commun, pour la décoration des espaces intérieurs.

**Catégorie:** Les plantes d'intérieur

**Famille:** Areaceae

**Genre:** Howea

**Espèce:** forsteriana

**Zone Géographique d'Origine:** Océanie

**Zones Climatiques:** Littoral subtropical, sud de l'Italie et îles

**Port:** Palmier à un stipe unique

**Feuilles:** Feuilles persistantes

**Colore Foglie:** Verde 

**Période de Floraison:** Luglio / Agosto / Settembre

**Fleur:** La grappe

**Colore Fiori:** Giallo 

**Sol:** Moyennement acide / Texture sableuse / Moyenne sol

**Besoins en Eau:** Eau moyenne

**Exposition à la Lumière:** Ombre / Demi ombre

**Forme:** Palmier / Touffe

**Colore Frutti:** Verde  Arancione  Viola 